

Ungleiche Klauen (UK)



© Fiedler, GER
Erheblicher Unterschied in Breite, Höhe/oder Länge zwischen Außen- und Innenklau, der sich durch die Klauenkorrektur nicht beheben lässt

Konkave Vorderwand (KV)



© Thomas, FRA
Konkave (d.h. nach innen gewölbte) Form der Vorderwand

Rollklau (RO)



© Kofler, AUT
Jegliche schraubenartige Drehung der Außen- oder Innenklau mit einwärts gedrehter Seitenwand; der Verlauf der Vorderwand weicht von einer geraden Linie ab

Dermatitis digitalis (DD)



© Müller, GER
Infektion der Haut um die Klauen und/oder im Zwischenklauenspalt mit oberflächlichen geröteten Defekten (Erosion), meist schmerzhaften tiefen Defekten (Geschwüren) und/oder chronischer warzenartiger Hautzubildung (Hyperkeratose/Proliferation)



© Thomas, FRA

Klauenfäule (ID)



© Knappe-Poindecker, NOR
Alle Arten milder Hautentzündungen im Bereich der Klauen, die nicht der Dermatitis digitalis (Mortellaro'sche Krankheit) zuzuordnen sind

Doppelte Sohle (DS)



© Fjeldaas, NOR
Zwei oder mehrere Lagen von Sohlenhorn mit Hohlräumen dazwischen

Ballenhornfäule (BF)



© Müller, GER
Auflösung und Fäulnis des Ballenhorns, in schweren Fällen Bildung typischer V-förmiger Furchen, die bis zur Lederhaut reichen können

Limax (LI)



© Kofler, AUT
In den Zwischenzehenspalt ragende Bindegewebszubildung

Scherenklau (SCH)



© Bergsten, SWE
Sich überkreuzende Klauenspitzen

Axialer Hornspalt (HSA)



© Malmö, AUS
Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, am inneren (axialen) Wandhorn der Klau

Hornkluff (HK)



© Greenough, CAN
Horizontal (=parallel zum Kronsaum) verlaufende Zusammenhangstrennung im Wandhorn

Hornspalt (HS)



© Kofler, AUT
Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, im Bereich des äußeren oder vorderen (dorsalen) Wandhorns

Zwischenklauenphlegmone (ZP)




© Kofler, AUT
Symmetrische, schmerzhafte Schwellung des Unterfußes, von der üblicherweise ein überriechender Geruch ausgeht, und die mit plötzlichem Auftreten von Lahmheit verbunden ist

Schwellung des Kronsaums u/o Ballens (SKW)



© Kofler, AUT
Ein- oder beidseitige Schwellung des Kronsaums und/oder des Ballens oberhalb der Hornkapsel, die durch verschiedene Erkrankungen bedingt sein kann

Flächenhaft (diffuse) Sohlenblutung (SBD)



© Capion, DK
Diffuse hellrote bis gelbliche Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)

Umschriebene Sohlenblutung (SBU)



© Kofler, AUT
Deutlich abgegrenzte rote Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)

Dünne Sohle (DUN)




© Fiedler, GER
Sohlenhorn gibt auf Fingerdruck nach (fühlt sich schwammartig an)

Weiß-Linie-Defekt (WLD)



© Kofler, AUT
Zusammenhangstrennung in der weißen Linie, die auch nach Angleichen der Sohlenfläche (nach Schritt 2 der Kauenpflege) bestehen bleibt

Weiß-Linie-Abzess (WLA)



© Kofler, AUT
Zusammenhangstrennung in der weißen Linie mit eitrig-nekrotisierender Entzündung der Wandlederhaut

Sohlengeschwür (SG)



© Delacroix, FRA
Umschriebener Defekt (Geschwür) des Sohlenhorns mit freiliegender entzündeter oder nekrotischer (abgestorbener) Lederhaut

Ballengeschwür (BG)



© Kofler, AUT
Klauenabszess im Bereich des Weichballens

Sohlenspitzenabszess (SGG)



© Fjeldaas, NOR
Klauenabszess im Bereich der Sohlenspitze

Sohlenspitzennekrose (SNN)



© Delacroix, FRA
Nekrose der Sohlenlederhaut an der Klauen Spitze mit Beteiligung des Klauenbeins